



Distrito de A.P.S. Huelva-Costa  
Distrito de A.P.S. Condado-Campiña  
Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



*INFORME DE SALUD LOCAL.  
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE ROCIANA*

*EPIDEMIOLOGÍA  
DAPS CONDADO CAMPIÑA 2016*



## Introducción

El presente documento pretende mostrar una aproximación del estado de salud de Rociana, más bien una “fotografía” inicial de la situación de salud del municipio a través de determinados indicadores o medidas.

La información de indicadores y medidas es un punto de partida para proseguir con la comunidad a trabajar en las posibles acciones en salud. Es una información cuantitativa y relevante que será completada con los recursos identificados por los propios residentes en el municipio que definirán las acciones en salud.

Los indicadores o medidas utilizadas pretenden recoger resultados en salud en términos de mortalidad y morbilidad y determinantes en salud según diversos modelos teóricos. Todos los indicadores utilizados han sido extraídos de sistema de registro y de estudios elaborados por distintas instituciones de nuestro ámbito como las áreas hospitalarias, distrito sanitario y delegación de salud.

La finalidad de este documento es apoyar al plan de acción local en salud del municipio.



## Contenidos:

1. Indicadores sociodemográficos y socioeconómicos
2. Indicadores del Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social en Andalucía.

### AISBI:

Resultados en salud: Mortalidad y Morbilidad

Determinantes en salud

Indicadores comparados con Andalucía

3. Resultados en salud: Mortalidad (análisis propio)
4. Determinantes en salud: asistencia sanitaria, participación en programas, porcentaje de vacunación infantil y estilos de vida.



## 1. Indicadores sociodemográficos y socioeconómicos

La población de Rociana tiene una distribución similar en cuanto a sexos. A continuación se detallan otros indicadores:

<u>Población total. 2015</u>	<b>7.643</b>	<u>Número de extranjeros. 2015</u>	<b>1.397</b>
<u>Población. Hombres. 2015</u>	<b>3.844</b>	<u>Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2015</u>	<b>Rumanía</b>
<u>Población. Mujeres. 2015</u>	<b>3.799</b>	<u>Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2015</u>	<b>54,90</b>
<u>Población en núcleos. 2015</u>	<b>7.560</b>	<u>Emigraciones. 2014</u>	<b>281</b>
<u>Población en diseminados. 2015</u>	<b>83</b>	<u>Inmigraciones. 2014</u>	<b>377</b>
<u>Porcentaje de población menor de 20 años. 2015</u>	<b>21,00</b>	<u>Nacimientos. 2014</u>	<b>103</b>
<u>Porcentaje de población mayor de 65 años. 2015</u>	<b>15,78</b>	<u>Defunciones. 2014</u>	<b>62</b>
<u>Incremento relativo de la población en diez años. 2015</u>	<b>16,99</b>	<u>Matrimonios de distinto sexo. 2014</u>	<b>30</b>



Distrito de A.P.S. Huelva-Costa  
Distrito de A.P.S. Condado-Campiña  
Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



## 2. Indicadores del Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social en Andalucía.


AISBI:

Resultados en salud: Mortalidad y Morbilidad

Determinantes en salud

Informe municipal: Rociana del Condado (Municipio)

### Mapa de la selección




© Escuela Andaluza de Salud Pública

Provincia: 21 - Huelva

Informe municipal: Rociana del Condado (Municipio)


**Demografía**

**Evolución de la población masculina**



Fuente: INE

**Evolución de la población femenina**



Fuente: INE

**Población por grupos de edad**


Edad	hombres	mujeres
< 5 años	208	207
05-10	222	192
10-15	186	176
15-19	210	202
20-24	255	251
25-29	309	324
30-34	359	328
35-39	337	356
40-44	314	321
45-49	299	288
50-54	240	209
55-59	166	174
60-64	202	173
65-69	168	149
70-74	123	155
75-79	136	124
80-84	77	100
85 y más	52	81

Fuente: INE - 2013

**Pirámide de población 2013**

hombres

mujeres




Fuente: INE

El municipio de Rociana presenta una evolución de la población femenina y masculina ligeramente superior a la andaluza desde los años 2001 a 2013. La pirámide de población está algo envejecida, sin embargo, persiste una elevada edad media de su población y una base algo más ancha que otros municipios.


Informe municipal: Rociana del Condado (Municipio)

**Mortalidad**

**Evolución de la tasa anual de mortalidad masculina**



**Evolución de la tasa anual de mortalidad femenina**



**Tasa de mortalidad**

Clase	Tasa por 10.000 hab.
total	103.5
1-14 años	0
15-44 años	2.8
45-64 años	35.5
65-74 años	188.7
75-84 años	807.2
85 años y más	1 824.8
hombres	99
hombres, 1-14 años	0
hombres, 15-44 años	5.6
hombres, 45-64 años	69
hombres, 65-74 años	274.9
hombres, 75-84 años	588.2
hombres, 85 años y más	1 929.8
mujeres	108.1
mujeres, 1-14 años	0
mujeres, 15-44 años	0
mujeres, 45-64 años	0
mujeres, 65-74 años	102.7
mujeres, 75-84 años	991.7
mujeres, 85 años y más	1 750

Fuente: Consejería de salud, igualdad y políticas sociales de Andalucía - 2012


La evolución de las tasas anuales de mortalidad según sexo muestra oscilaciones debidas al tamaño pequeño de la población. Esto hace que estos datos se tomen con cautela.



Informe municipal: Rociana del Condado (Municipio)


Accidentes de tráfico

Evolución de la tasa anual de accidente de tráfico en hombres



Fuente: DGT

Evolución de la tasa anual de accidente de tráfico en mujeres



Fuente: DGT

Tasa de accidentes de tráfico

Clase	Tasa por 100.000 hab.
total	443.1
hombres	466
hombres de 0 a 14 años	324.7
hombres de 15 a 24 años	1 075.3
hombres de 25 a 44 años	606.5
hombres de 45 y más años	205.1
mujeres	419.9
mujeres de 0 a 14 años	0
mujeres de 15 a 24 años	1 545.3
mujeres de 25 a 44 años	376.2
mujeres de 45 y más años	275.3

Fuente: DGT - 2013

Accidentes no mortales 2013



Fuente: DGT

La evolución de la tasa anual de accidente de tráfico en hombres se mantuvo por debajo de la andaluza hasta 2009, 2012 y 2013 en dichos años se produjo un ascenso por encima de la tasa andaluza. En las tasas en mujeres se mantuvo por debajo de la andaluza hasta 2011 y 2013 donde sobrepasó la tasa andaluza. Aunque los datos se denen tomar con cautela dada la población pequeña. Se debe observar este dato para futuros años.

Informe municipal: Rociana del Condado (Municipio)

**Igualdad de género**

**Brecha de género en educación (x100)**

Nivel de educación	Selección 2001	Andalucía 2001
primer grado	81.2	100.3
segundo grado	95.8	95
superior	100	106.5

Fuente: INE - 2001

**Definición:**


Brecha de género = número de mujeres por cada 100 hombres

**Empleo femenino no agrícola**

	Selección 2001	Andalucía 2001
Porcentaje de empleo femenino no agrícola (%)	9.8	25.2


Fuente: INE - 2001

**Brecha de género en educación:  
 primaria 2001**




Fuente: INE

**secundaria 2001**



Fuente: INE

**superior 2001**




Fuente: INE

La brecha de género en educación muestra como el nivel de estudios se mantiene en porcentajes muy similares para hombres y Rociana tiene menor porcentaje de mujeres con empleo no agrícola que Andalucía.

Informe municipal: Rociana del Condado (Municipio)


**Economía**

**Evolución del ingreso municipal por habitante (€)**




Fuente: Ministerio de hacienda y administraciones públicas

**Evolución del gasto municipal por habitante (€)**



Fuente: Ministerio de hacienda y administraciones públicas

**Resultado = Ingreso - Gasto (€/hab.)**



Fuente: Ministerio de hacienda y administraciones públicas

La evolución del ingreso municipal por habitante y de gasto municipal por habitante es inferior al de Andalucía.



## Indicadores comparados con Andalucía

En el bloque de indicadores relacionados con mortalidad, morbilidad y determinantes en salud se observa que la tasa anual de incidencia de tuberculosis en 2013 también fue significativamente peor. Las altas hospitalarias por diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares y por autolesiones no fue significativamente diferente de la media andaluza.

En las tasa de víctimas de accidentes de tráfico en 2013 fue significativamente peor principalmente en vías interurbanas.

Los hogares formados por una persona mayor de 65 años que vive sola es significativamente mejor que en Andalucía, existe un porcentaje menor que el porcentaje medio andaluz. Sin embargo, si lo analizamos por sexo en los hombres está significativamente peor y en las mujeres significativamente mejor.

La tasa bruta de natalidad y la tasa en mujeres entre 40 y 49 años es significativamente peor que la andaluza, la tasa de natalidad es inferior.

Las tasas referidas a ingresos evitables (PQI) por patologías como enfermedades cardiovasculares, angina sin procedimiento y enfermedades crónicas es significativamente peor que la andaluza.

<b>Indicadores</b>		<b>Rociana</b>	<b>Andalucía</b>	<b>Comparada Andalucía</b>
MORTALIDAD	Tasa de mortalidad por todas las causas por 100.000 hab., 2012	103,5	80,9	
MORBILIDAD	Tasa anual de incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes, 2013	39,1	9	
MORBILIDAD	Altas hospitalarias por diabetes por 100.000 habitantes, 2013	65,2	32,7	
MORBILIDAD	Altas hospitalarias por cardiopatía isquémica por 100.000 habitantes, 2013	260,7	235,9	
MORBILIDAD	Altas hospitalarias por enfermedades cerebrovasculares por 100.000 habitantes, 2013	182,5	173,4	
MORBILIDAD	Altas hospitalarias por autolesiones por 100.000 habitantes, 2013	26,1	16,3	
MORTALIDAD	Mortalidad infantil (%), 2012	0	3,3	
DETERMINANTES	Tasa de víctimas de accidentes de tráfico por 100.000 habitantes, 2013	443,1	248,1	
DETERMINANTES	Tasa de víctimas de accidentes de tráfico en vías urbanas por 100.000 habitantes, 2013	104,3	136	
DETERMINANTES	Tasa de víctimas de accidentes de tráfico en vías interurbanas por 100.000 habitantes, 2013	338,9	112,1	
MORTALIDAD	Tasa de muertes por accidentes de tráfico por 100.000 habitantes, 2013	0	3,1	
MORTALIDAD	Tasa de muertes por accidentes de tráfico en vías urbanas por 100.000 habitantes, 2013	0	0,8	
MORTALIDAD	Tasa de muertes por accidentes de tráfico en vías interurbanas por 100.000 habitantes, 2013	0	2,3	
MORTALIDAD	Tasa de muertes por accidentes de tráfico (hombres) por 100.000 habitantes, 2013	0	4,9	
MORTALIDAD	Tasa de muertes por accidentes de tráfico (mujeres) por 100.000 habitantes, 2013	0	1,3	
	Hogares formados por 1 per. mayor de 65 años que viven solas (%), 2011	7,1	8,6	
	Hogares formados por 1 hombre solo mayor de 65 años (%), 2011	3,6	2	
	Hogares formados por 1 mujer sola mayor de 65 años (%), 2011	3,5	6,5	
	Abstención en elecciones generales (Congreso) (%), 2011	28,1	29,3	
	Abstención en elecciones generales (Senado) (%), 2011	28,4	29,5	
	Abstención en elecciones municipales (%), 2011	25,5	34,2	
	Porcentaje de empleo femenino no agrícola (%), 2001	9,8	25,2	
DETERMINANTES	Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes, 2013	10,9	9,7	
DETERMINANTES	Personas mayores de 64 años (%), 2013	15,2	15,6	
DETERMINANTES	Envejecimiento del envejecimiento (%), 2013	26,6	27,7	
DETERMINANTES	Tasa de natalidad en mujeres entre 40 y 49 años (%), 2012	3,4	6,7	
	Viviendas principales (%), 2011	83	70,9	
	Viviendas secundarias (%), 2011	3,2	14,4	
	Viviendas vacías (%), 2011	13,9	14,6	
MORBILIDAD	Tasa PQI, diabetes, 2013	65,2	75	
MORBILIDAD	Tasa PQI, complicaciones agudas de la diabetes, 2013		6,8	
MORBILIDAD	Tasa PQI, complicaciones crónicas de la diabetes, 2013	65,2	59	
MORBILIDAD	Tasa PQI, amputación de miembros inferiores, 2013		8,5	
MORBILIDAD	Tasa PQI, enfermedades cardio-vasculares, 2013	299,8	192,6	
MORBILIDAD	Tasa PQI, insuficiencia cardiaca congestiva, 2013	104,3	142,4	
MORBILIDAD	Tasa PQI, angina sin procedimiento, 2013	195,5	50,2	
MORBILIDAD	Tasa PQI, enfermedades crónicas, 2013	508,3	351,7	
MORBILIDAD	Tasa PQI, enfermedades agudas, 2013	156,4	151,9	
MORBILIDAD	Tasa PQI, global, 2013	664,7	503,6	

significativamente peor significativamente mejor no es significativamente diferente de la media



### 3. Resultados en salud: Mortalidad (análisis propio)

La causa seleccionada a continuación está dentro de las primeras causas con más años de vida potencialmente perdidos y presenta un exceso de años al compararse con Andalucía.

Causa de mortalidad con exceso de años de vida potencialmente perdidos por causa de mortalidad en mujeres:

1. Enfermedades respiratorias crónicas de vías bajas
2. Infecciones respiratorias agudas
3. Cáncer de colon

Causa de mortalidad con exceso de años de vida potencialmente perdidos por causa de mortalidad en hombres:

1. Diabetes mellitus
2. Enfermedad Isquémica del corazón
3. Cáncer de estómago

Fuente: Datos de registro de mortalidad de Andalucía 2002-2006. Elaborado por Área hospitalaria Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena.



#### 4. Determinantes en salud

##### Asistencia sanitaria

-Tasa de participación en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama

Descripción: Calcula, independientemente del número de citaciones, el porcentaje de mujeres que han sido exploradas al menos una vez.

Cálculo:  $N^{\circ}$  de mujeres exploradas / Población elegible x 100

Numerador:

Número de mujeres exploradas al menos una vez en el periodo de estudio.

1. Mujeres a las que se les realiza el estudio mamográfico de cribado (test de screening).
2. Número de mujeres que aportan una mamografía realizada como máximo 6 meses antes de la cita, que cumpla los criterios metodológicos del programa en cuanto a proyecciones, que es interpretada y sigue el mismo proceso de las que se realizan en la propia unidad.

Denominador: Población elegible: Mujeres a las que se les ha ofrecido la participación, al menos una vez, en el periodo evaluado.

Fuente: Programa Detección Cáncer de Mama (DCM). Distrito Condado Campiña.

Periodo: 2013

<b>Asistencia Sanitaria 2015</b>	Tasa de participación	Tasa de participación mínima necesaria
Programa de detección precoz de cáncer de mama	77.70	70

Fuente: Programa Detección Cáncer de Mama (DCM). Distrito Condado Campiña



-Participación en programas de promoción de salud

Asistencia Sanitaria 2015	Programa	Cobertura de los centros
Programas de promoción de salud	Forma Joven	100%
	Creciendo en salud	20%

-Porcentaje de cobertura de vacunación completa.

La descripción del indicador es la siguiente: “número total de niños / as nacidos en el periodo anual dos años antes del que hay que evaluar que han recibido vacunación completa (vacunas correspondientes a calendario hasta 18 meses / Número total de niños / as nacidos en el periodo anual dos años antes del que hay que evaluar x 100” en el municipio, provincia y Andalucía. Este indicador es importante que sea mayor del 95% para garantizar las coberturas vacunales.

Fuente: Diraya Vacunas.

Periodo: 1 enero – 1 diciembre de 2016.

Porcentaje de cobertura de vacunación completa.
Rociana
90.1%





### **-Porcentaje de cobertura de la vacunación frente a la Triple Vírica a los 4 años.**

La descripción del indicador es la siguiente: “Número de niños / as nacidos cuatro años antes del periodo que hay que evaluar que han recibido la segunda dosis de vacuna triple vírica correspondiente a los tres años de edad / Número de niños / as nacidos en el periodo anual cuatro años antes del que hay que evaluar” en el municipio, provincia y Andalucía.

Fuente: Diraya Vacunas.

Periodo: 1 Enero – 1 diciembre de 2016

#### **Porcentaje de cobertura de triple vírica a los 4 años**

Rociana  
91.7%

### **-Estilos de vida**

Estos datos están extraídos de la Encuesta Andaluza de Salud de 2011.

El consumo diario de frutas en hombres en 2011 se realizó en el 58,16% de los hombres de la provincia de Huelva frente al 59,21% en Andalucía. En las mujeres el consumo en 2011 fue de 70,75% superior al consumo medio andaluz en mujeres que correspondió al 68,04%.

El consumo diario de verduras en hombres en 2011 se realizó en el 26.53% de los hombres de la provincia de Huelva frente al 35.90% en Andalucía. En las mujeres el consumo en 2011 fue de 32.08% frente al 45.88% en Andalucía.

El sobrepeso en hombres en 2011 fue de 42.86% en la provincia de Huelva frente al 47.90% en Andalucía. En las mujeres fue del 27.36% frente al 31.78% de Andalucía.



La obesidad en la población andaluza en hombres fue del 18.88% en la provincia de Huelva frente al 15.89% en Andalucía. En las mujeres fue de 17.92% frente al 20.29% en Andalucía.

El sedentarismo en el tiempo de ocio en la población de la provincia fue del 86.27% frente al 85.58% en Andalucía.

Respecto al tabaquismo, el 34,56% de la población es fumadora, la segunda provincia de Andalucía con el porcentaje más elevado.

El porcentaje de hombres fumadores con hipertensión en 2011 en la provincia de Huelva fue del 37.9% frente al 23.1% de Andalucía. En las mujeres el porcentaje de mujeres fumadoras con hipertensión fue del 10.9% frente al 8.7% en Andalucía.